Seguimiento de evaluación Vanderbilt de NICHQ: informante de padres

Fed	cha de hoy:						
No	mbre del niño:						
Fed	cha de nacimiento del niño:						
No	mbre del padre o la madre:						
Nú	mero de teléfono del padre o la madre:						
Pie	strucciones: Cada calificación debe tenerse en cuenta en el contexto de lo qu ense en las conductas de su hijo desde que completó la última escala de evalu sta evaluación se basa en un tiempo en el que el niño		,				
	estaba medicado? □ no estaba medicado? □ no está seguro?						
Si	está tomando medicamentos, haga una lista de nombres y dosis de los medic	amentos	:				
Sín	ntomas	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo	1	
1.	No presta atención a los detalles o comete errores de descuido con, por ejemplo, la tarea					ı	
2.	Tiene dificultad para prestar atención a lo que debe hacerse						
3.	Parece no escuchar cuando se le habla directamente					,	
4.	No obedece cuando le dan instrucciones y no termina las actividades (no porque se niegue ni porque no entienda)					•	
5.	Tiene dificultad para organizar tareas y actividades						
6.	Evita, le disgusta o no quiere comenzar tareas que requieren de un esfuerzo mental constante						
7.	Pierde las cosas necesarias para las tareas o las actividades (juguetes, trabajos, lápices, libros)						
8.	Se distrae fácilmente por ruidos u otros estímulos					Para uso exclusivo del consulto	
9.	Es olvidadizo en las actividades cotidianas					For Office Use Only	/9
10.	Juguetea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento					ı	
_	Se levanta de su asiento cuando se espera que permanezca sentado	0	1	2	3	-	
_	Corre por todas partes o escala demasiado cuando se espera que permanezca sentado						
13.	Tiene dificultad para jugar o comenzar actividades de juegos tranquilos						
14.	Con frecuencia no se detiene, o actúa como si estuviera "impulsado por un motor	r"					
15.	Habla demasiado						
16.	Lanza las respuestas antes de haber terminado las preguntas						
17.	Tiene dificultad para esperar su turno					Para uso evolucius dal assuru	
18.	Interrumpe o se entromete en las conversaciones o actividades de los demás					Para uso exclusivo del consulto For Office Use Only	/9



Síntomas (continuación)	Nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo	
19. Discute con los adultos					
20. Pierde la paciencia					
21. Desafía en forma activa o se niega a obedecer los pedidos o las regla	s de los adultos				
22. Molesta a la gente deliberadamente					
23. Culpa a otros por sus errores o mala conducta					
24. Es sensible o se molesta fácilmente con los demás					
25. Se muestra enojado o resentido					Para uso exclusivo del consultorio/
26. Es rencoroso y busca vengarse					For Office Use Only
	Por encima el promedio Prome	Alg dio problen		olemático	
27. Lectura					Para uso exclusivo del consultorio/
28. Escritura					For Office Use Only 4s:/3 Para uso exclusivo del consultorio/
29. Matemática					For Office Use Only 5s:/3
30. Relación con los padres					
31. Relación con los hermanos					Para uso exclusivo del consultorio/
32. Relación con los compañeros					For Office Use Only 4S:/4 Para uso exclusivo del consultorio/
33. Participación en actividades organizadas (p. ej. equipos)					For Office Use Only 5s:/4
Adantado de las Escalas de calificación Vanderbilt desarrolladas nor el C	Or Mark I. Wolraich				5s:

Adaptado de las Escalas de calificación Vanderbilt desarrolladas por el Dr. Mark L. Wolraich.

Efectos secundarios: ¿Ha sufrido su hijo alguno de los siguientes efectos secundarios?		¿Son estos efectos secundarios un problema actualmente?					
¿Representaron un problema durante la semana pasada?	Ninguno	Leves	Moderados	Graves			
Dolor de cabeza							
Dolor de estómago							
Cambio en el apetito—explique a continuación							
Problemas para dormir							
Irritabilidad a media mañana, a media tarde o por las noches—explique a continuación							
Socialmente retraído—disminución de interacción con los demás							
Tristeza extrema o llanto inusual							
Se muestra aburrido, cansado, apático							
Temblores							
Movimientos repetitivos, tics, espasmos, temblores musculares, parpadeo—explique a continuación							
Se rasca la piel o los dedos compulsivamente, se come las uñas, se muerde los labios o las mejillas—explique a continuación							
Ve o escucha cosas que no existen							

Explique/comente:

Adaptado de la escala de efectos secundarios Pittsburgh, desarrollada por William E. Pelham, Jr, PhD. Disponible para descargar gratuitamente en formato expandido en: http://ccf.FIU.edu.



Para uso exclusivo del consultorio/For Office Use Only			
Total number of questions scored 2 or 3 in questions 1–9:			
Total number of questions scored 2 or 3 in questions 10—18:			
Total number of questions scored 2 or 3 in questions 19—26:			
Total number of questions scored 4 in questions 27—29:			
Total number of questions scored 5 in questions 27—29:			
Total number of questions scored 4 in questions 30—33:			
Total number of questions scored 5 in questions 30—33:			

Las recomendaciones en esta publicación no indican un curso de tratamiento exclusivo ni sirven como estándar de atención médica. Las variaciones tal vez sean adecuadas, teniendo en cuenta las circunstancias individuales. Se incluye el documento original como parte de Caring for Children With ADHD: A Resource Toolkit for Clinicians (Atención de niños con TDAH; juego de recursos para profesionales de la salud), 2da edición. Copyright © 2012 de la Academia Americana de Pediatría. Todos los derechos reservados. La Academia Americana de Pediatría no revisa ni respalda ninguna modificación realizada a este documento, y en ningún caso será responsable de dichos cambios.





